


Rappel des manifestations cliniques de la Covid 19

Le HCSP recommande de considérer qu'en dehors des **signes infectieux (fièvre, frissons) et des signes classiques des infections respiratoires (fièvre, toux, dyspnée)**, les manifestations cliniques suivantes, de survenue brutale, comme des éléments d'orientation diagnostique du Covid-19 :


- En population générale : asthénie inexpliquée, myalgies inexpliquées, céphalées en dehors d'une pathologie migraineuse connue, anosmie ou hyposmie sans rhinite associée, agueusie ou dysgueusie ;
- Chez les personnes de plus de 80 ans : altération de l'état général, chutes répétées, apparition ou aggravation de troubles cognitifs, syndrome confusionnel, diarrhée, décompensation d'une pathologie antérieure ;
- Chez les patients en situation d'urgence : troubles du rythme cardiaque récents ; atteintes myocardiques aiguës ; événement thromboembolique grave.



Algorithme de décision pour la prescription de PCR chez les patients symptomatiques



Algorithme de décision pour la prescription de PCR chez les patients asymptomatiques



Définition d'un cas contact :

- Ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ;
- Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d'1 mètre, quelle que soit la durée (ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). **En revanche, des personnes croisées dans l'espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes-contacts à risque ;**
- Ayant prodigué ou reçu des actes d'hygiène ou de soins ;
- Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel ...) pendant au moins 15 minutes avec un cas ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d'éternuement ;
- Étant élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelle, primaire, secondaire, groupe de travaux dirigés à l'université).

Algorithme de décision pour la prescription de PCR chez les cas contacts

Dater la date contact avec un cas confirmé

Examen clinique incluant : Prise de température, du pouls de la tension artérielle, de la fréquence respiratoire, la mesure de la saturation en oxygène, l'auscultation

