

# RAPPEL DES RÈGLES CONCERNANT LE SECOND RAPPEL VACCINAL CONTRE LE COVID-19

Synthèse des DGS-Urgent N°2022\_40, N°2022\_47, N°2022\_67 & N°2022\_68

## PERSONNES ÉLIGIBLES AU SECOND RAPPEL :

- Toutes les **personnes de plus de 60 ans**
- L'ensemble des **résidents d'EHPAD et d'USLD**
- Les **personnes immunodéprimées**
- Adultes âgés **de 18 à 60 ans identifiés** comme étant **à risque de forme grave de Covid \***
- **Femmes enceintes**, dès le 1er trimestre de grossesse
- **Personnes vivant dans l'entourage** ou au contact régulier **de personnes vulnérables ou immunodéprimées**, dans une stratégie de cocooning.
- **Tous les professionnels de santé** tel que défini dans le code de la santé publique quel que soit leur âge ou leur état de santé (ne rentre pas dans le champs de l'obligation vaccinale)
- **Les salariés du secteur de la santé et du secteur médico-social**, quel que soit leur âge, leur mode d'exercice et leur état de santé (ne rentre pas dans le champs de l'obligation vaccinale)

## RÈGLES D'ADMINISTRATION DU SECOND RAPPEL SANS INFECTION APRÈS LE PREMIER RAPPEL :

- dès **3 mois après le premier rappel** pour les **personnes âgées de 80 ans et plus**, ainsi que pour les **résidents en EHPAD et en USLD et les personnes sévèrement immunodéprimées**, quel que soit leur âge
- dès **6 mois après le premier rappel** pour les autres personnes éligibles.

## RÈGLES D'ADMINISTRATION DU SECOND RAPPEL AVEC UNE INFECTION APRÈS LE PREMIER RAPPEL :

- dès **3 mois après l'infection** pour les **personnes âgées de 80 ans et plus**, ainsi que pour les **résidents en EHPAD et en USLD et les personnes sévèrement immunodéprimées**, quel que soit leur âge
- dès **3 mois après l'infection et 6 mois après le premier rappel** pour les autres personnes éligibles.

## \*RAPPEL DES PATHOLOGIES POUVANT ENTRAINER DES FORMES GRAVES

- **Antécédents (ATCD) cardiovasculaires** : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), **ATCD d'accident vasculaire cérébral** ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- **Diabète non équilibré** ou présentant des complications ;
- **Pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale** : broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose ;
- **Insuffisance rénale chronique sévère** ;
  - **Cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie)** ;
  - **Obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2)** ;
  - **Cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins** ;
  - **Syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie** ;
    - **Maladie du motoneurone, myasthénie grave, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, paralysie cérébrale, quadriplégie ou hémiplégié, tumeur maligne primitive cérébrale, maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare**
  - **Trisomie 21**